

Les Français et la prévention contre le VIH

Quelle perception les Français ont-ils du VIH ?

Quelle sont leurs représentations des modes de contamination et des moyens de s'en protéger ?

Mars 2026

Magalie Gérard, Directrice adjointe du Département Politique – Opinion

Sylvain Reich, Directeur conseil au Département Politique – Opinion

Rémy Broc, Chef de groupe au Département Politique – Opinion



Méthodologie d'enquête

P.3

1 Une large majorité de Français estiment que les sujets liés à la santé sexuelle, en particulier ceux concernant le VIH et les IST, ne sont pas assez abordés. Par ailleurs, l'idée que le VIH est une maladie qui se guérit progresse depuis 2024. P.5

2 Les Français disposent d'un bon niveau de connaissance des modes de transmission du VIH, mais ne perçoivent pas l'impact des traitements sur les niveaux de risque. Des perceptions stables dans le temps. P.11

3 Que ce soit en matière de prévention ou de dépistage du VIH, les comportements et le niveau de connaissance des Français restent perfectibles. Ils se sentent d'ailleurs moins concernés qu'il y a deux ans. P.18

4 Si parler du VIH avec ses proches reste difficile pour une partie de la population, les professionnels de santé sont jugés comme des interlocuteurs prioritaires. Cela malgré la concurrence des moyens d'informations numériques, notamment l'IA chez les plus jeunes. P.27



Terrain

Enquête réalisée **en ligne** du **17 au 23 mars 2026**.



Echantillon

Échantillon de **2 124** personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.



Quotas

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région et taille d'agglomération de l'interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

- Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
- Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
- Les rappels font référence aux études suivantes :
 - Enquête « Les Français et la prévention contre le VIH » réalisée par Toluna Harris Interactive pour Gilead. Etude réalisé en ligne du 7 au 11 **juin 2024** auprès d'un échantillon de 2 051 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
 - Enquête « Les Français et la lutte contre le VIH » réalisée en ligne par Toluna Harris Interactive pour le **CRIPS Île-de-France** du 13 au 17 **octobre 2023**, auprès d'un échantillon de 1 050 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus
 - Enquête « Les Français et les traitements de prévention contre le VIH/sida », réalisée en ligne par Toluna Harris Interactive pour le **CRIPS Ile-de-France** du 21 au 25 **octobre 2022** auprès d'un échantillon de 1 009 personnes représentatif des Français âgés de 15 ans et plus.
 - Enquête « Le rapport des Français au VIH/sida 40 ans après son apparition : évaluation des connaissances et des perceptions », étude en ligne réalisée par CSA Research pour le **CRIPS Ile-de-France** du 29 septembre au 6 **octobre 2021** auprès d'un échantillon de 1 004 personnes représentatif des Français âgés de 15 ans et plus.
 - Enquête « La nouvelle sociologie du VIH » réalisée en ligne par Toluna Harris Interactive pour **Francoscopie/Gilead** du 8 au 10 **septembre 2020**, auprès d'un échantillon de 2 225 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.



Intervalle de confiance


L'intervalle de confiance (parfois appelé « marge d'erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille de l'échantillon. Si le calcul de l'intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu'il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.


Taille de l'échantillon	5% ou 95%	10% ou 90%	20% ou 80%	30% ou 70%	40% ou 60%	50%
100 interviews	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10
200 interviews	3,1	4,3	5,7	6,5	6,9	7,1
300 interviews	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
400 interviews	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
500 interviews	2,0	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600 interviews	1,8	2,4	3,3	3,8	4,0	4,1
800 interviews	1,5	2,1	2,8	3,2	3,4	3,5
1 000 interviews	1,4	1,8	2,5	2,9	3,0	3,1
2 000 interviews	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,3
3 000 interviews	0,8	1,1	1,5	1,7	1,8	1,8
4 000 interviews	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
6 000 interviews	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4

Note de lecture : dans le cas d'un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d'erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 point).

Une large majorité de Français estiment que les sujets liés à la santé sexuelle, en particulier ceux concernant le VIH et les IST, ne sont pas assez abordés. Par ailleurs, l'idée que le VIH est une maladie qui se guérit progresse depuis 2024.

Une large majorité des Français affirment que l'on ne parle pas assez des différents sujets liés à la sexualité, en particulier les infections sexuellement transmissibles.




 De manière générale, on remarque que les femmes affirment un peu plus qu'on ne parle pas assez de ces différents sujets.

Pour chacun des sujets suivants liés la sexualité, diriez-vous qu'on en parle trop, pas assez, ou ni trop ni pas assez aujourd'hui ?
Base : A tous, en %

Les Français estiment un peu plus qu'il y a deux ans que l'on ne parle pas assez des moyens de prévention des IST/du VIH, des troubles sexuels féminins ainsi que des violences sexistes et sexuelles. On observe également une très légère progression en ce qui concerne le VIH (et encore plus forte si l'on compare à 2020).

■ 2024

■ 2026




En 2020, 43% des Français estimaient qu'on ne recevait pas assez d'informations sur le VIH

Pour chacun des sujets suivants liés la sexualité, diriez-vous qu'on en parle trop, pas assez, ou ni trop ni pas assez aujourd'hui ?


Base : A tous, en % de réponses « **On n'en parle pas assez** »

Les plus âgés ainsi que les personnes homosexuelles et bisexuelles affirment plus que les autres que les moyens de prévention ne sont pas assez mis en avant dans le débat public.

Le VIH (virus pouvant entraîner le SIDA)



Les moyens de prévention contre les IST et/ou le VIH




■ On n'en parle pas assez ■ On en parle trop ■ On en parle ni trop, ni pas assez ■ Ne se prononce pas

Pour chacun des sujets suivants liés la sexualité, diriez-vous qu'on en parle trop, pas assez, ou ni trop ni pas assez aujourd'hui ?
Base : A tous, en %


Les résultats encadrés sont significativement supérieurs ou inférieurs aux résultats d'ensemble

Le SIDA est perçu par une majorité des Français comme une maladie effrayante, dont on meurt encore beaucoup aujourd'hui, et pour laquelle on ne guérit pas. Près de 9 Français sur 10 affirment également que c'est une maladie bien actuelle.



Aujourd'hui, diriez-vous que le VIH/SIDA est... ?
 Base : A tous, en %

Des perceptions stables dans le temps, seule la perception d'une maladie dont on guérit progresse légèrement.




Aujourd'hui, diriez-vous que le VIH/SIDA est... ?
Base : A tous, en % de réponses « *Oui* »

Les Français disposent d'un bon niveau de connaissance des modes de transmission du VIH, mais ne perçoivent pas l'impact des traitements sur les niveaux de risque. Des perceptions stables dans le temps.

8 Français sur 10 affirment se sentir bien informés sur le VIH/SIDA, un score stable dans le temps.


Bien informés : 80




Mal informés : 20

- Très bien informé(e)
- Assez bien informé(e)
- Assez mal informé(e)
- Très mal informé(e)

Par rapport au VIH/sida, estimez-vous être...
Base : A tous, en %



Si une large majorité des Français estiment être bien informés par rapport au VIH/SIDA, et ce, quel que soit leur profil, une faible proportion affirme être « très bien » informée. Les plus de 50 ans et les catégories socioprofessionnelles supérieures déclarent un niveau d'information plus élevé.




Par rapport au VIH/sida, estimez-vous être...

Base : A tous, en % de réponses « Bien informés » et « Très bien informés »

Les résultats encadrés sont significativement supérieurs ou inférieurs aux résultats d'ensemble

De manière générale, les Français identifient mal l'impact des traitements contre le VIH sur les risques de contamination. Les relations sexuelles non protégées et le contact avec le sang sont perçus comme les éléments les plus à risque. Des perceptions qui sont stables depuis 2024, mais globalement une amélioration est constatée depuis 2020.

Avec une personne porteuse du VIH qui ne prend pas de traitement contre le VIH
 Avec une personne porteuse du VIH qui prend un traitement contre le VIH



2024	2020*
87	-
87	84
82	89
81	
79	-
81	
64	81
67	
56	-
63	
21	36
22	
20	36
21	
13	27
14	
6	20
8	
8	20
8	
4	16
5	


Selon vous, peut-on attraper le VIH dans les situations suivantes avec une personne porteuse du VIH qui prend un traitement contre le VIH ?
 Et selon vous, peut-on attraper le VIH dans les situations suivantes avec une personne porteuse du VIH qui ne prend pas de traitement contre le VIH ?
 Base : A tous, en % de réponses « **Oui** »

*: ces données sont présentées de manière indicatives, car les formulations des items et de la question (D'après ce que vous en savez, est-ce possible ou impossible d'attraper le VIH... ?) étaient sensiblement différentes en 2020.

De manière générale, les moins de 35 ans affirment davantage d'idées fausses concernant le risque de contamination au VIH, que ce soit par la piqûre d'un moustique ou un échange de salive / un baiser.

Avec une personne porteuse du VIH qui ne prend pas de traitement contre le VIH

Avec une personne porteuse du VIH qui prend un traitement contre le VIH




Selon vous, peut-on attraper le VIH dans les situations suivantes avec une personne porteuse du VIH qui prend un traitement contre le VIH ?

Et selon vous, peut-on attraper le VIH dans les situations suivantes avec une personne porteuse du VIH qui ne prend pas de traitement contre le VIH ?

Base : A tous, en % de réponses « Oui »


Les résultats encadrés sont significativement supérieurs ou inférieurs aux résultats d'ensemble

Un tiers des Français estime que le risque d'être infecté par le VIH est élevé pour la population française en général. Néanmoins, concernant leur situation personnelle ou celle de leurs proches, ce risque est jugé bien plus faible. Les moins de 35 ans estiment davantage que leurs aînés que l'ensemble des catégories de population ont un risque élevé d'être infectées par le VIH.



Selon vous, le risque est-il élevé ou faible pour chacune des personnes suivantes d'être infecté(e) par le VIH (virus pouvant entraîner le SIDA) ... ?
 Base : A tous, en %

Pour l'ensemble des catégories de populations, des perceptions stables depuis 2024 mais en recul depuis 2020.




Selon vous, le risque est-il élevé ou faible pour chacune des personnes suivantes d'être infecté(e) par le VIH (virus pouvant entraîner le SIDA) ... ?
Base : A tous, en % de réponses « **Risque élevé** »



Que ce soit en matière de prévention ou de dépistage du VIH, les comportements et le niveau de connaissance des Français restent perfectibles. Ils se sentent d'ailleurs moins concernés qu'il y a deux ans.

Comme en 2024, la moitié des Français (et davantage chez les moins de 35 ans) qui ont eu un nouveau partenaire sexuel au cours des dernières années affirment ne pas s'être protégés du risque d'infection au VIH de manière systématique...

54% des Français déclarent avoir rencontré au moins un nouveau partenaire sexuel au cours de ces dernières années.



Pas systématiquement : 51



■ Systématiquement

■ Le plus souvent


■ Rarement

■ Jamais

Au cours des dernières années, lorsque vous avez rencontré un nouveau partenaire sexuel, vous vous êtes protégé(e) du risque d'être infecté(e) par le VIH... ?
 Base : A ceux qui déclarent avoir rencontré au moins un nouveau partenaire sexuel au cours de ces dernières années, en %

... notamment pour des raisons affichées de confiance en son/partenaire, devant des aspects de confort et de manque de préservatifs. L'idée de ne pas se sentir concerné par le VIH est un argument qui progresse.

Rappel 2024




Lorsque cela vous est arrivé, pour quelle(s) raison(s) ne vous êtes-vous pas protégé(e) ? Plusieurs réponses possibles

Base : A ceux qui déclarent ne pas s'être systématiquement protégés, en %



Deux tiers des Français qui affirment avoir eu une relation sexuelle non protégée avec un nouveau partenaire déclarent ne pas s'être fait dépistés systématiquement, notamment les plus âgés. Un résultat malgré tout légère baisse depuis 2024.

45% des Français déclarent avoir eu au moins une relation sexuelle non protégée avec un nouveau partenaire



■ Oui, à chaque fois ■ Oui, mais pas à chaque fois ■ Non


Pas systématiquement : 66



Après avoir eu une relation sexuelle non protégée avec un nouveau partenaire, vous faites-vous dépister pour le VIH et/ou les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ?
 Base : A ceux qui déclarent avoir eu au moins une relation sexuelle non protégée avec un nouveau partenaire, en %


Pour expliquer les raisons qui les amènent à ne pas se faire dépister à chaque fois, le fait de ne pas se sentir concerné est avancé en premier lieu. Comme pour les raisons de non-protection, cet argument progresse depuis 2024.

Rappel 2024




Pour quelle(s) raison(s) ne vous faites-vous pas dépister pour le VIH et/ou les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) à chaque fois ? Plusieurs réponses possibles
Base : A ceux qui déclarent ne pas se faire dépister systématiquement, en %

Le préservatif est perçu par l'écrasante majorité des Français comme un moyen de protection contre le VIH. Si le traitement d'urgence post-exposition protège contre le VIH pour la moitié des Français, il n'est pas jugé efficace à 100%. Comme en 2024, la PrEP est encore mal connue des Français.



Selon vous, chacun des moyens suivants protège-t-il ou non contre le VIH ?
Base : A tous, en %

Depuis 2024, on observe peu d'évolution dans la perception de l'efficacité des moyens de protection face au VIH hormis le dépistage, en hausse de 3 points.




À noter qu'il n'y a pas non plus d'évolutions significatives sur la réponse « Cela protège à 100% » et sur le « Vous ne savez pas du tout »


Selon vous, chacun des moyens suivants protège-t-il ou non contre le VIH ?
Base : A tous, en % de réponse « Cela protège »

Une méconnaissance de la PrEP qui se confirme ici : seuls un quart des Français affirment avoir entendu parler de la PrEP, dont seulement 1 sur 10 qui déclare savoir précisément ce dont il s'agit. Une notoriété semblable à celle mesurée il y a 2 ans, portée par les jeunes et les personnes non-hétérosexuelles.

Ont entendu parler de la PrEP : 26



Avez-vous déjà entendu parler de la PrEP ?
Base : A tous, en %




A noter que les personnes qui ont entendu parler de la PrEP sont plus à même de penser que cela protège contre le VIH.

Comme en 2024, la PrEP est perçue avant tout comme un moyen de protection destiné à tout le monde, quelque soit son genre ou son orientation sexuelle.

26% des Français indiquent avoir entendu parler de la PrEP.

Selon eux, la PrEP...

Rappel 2024




Selon vous, la PrEP...

Base : A ceux qui déclarent avoir entendu parler de la PrEP, en %

Si parler du VIH avec ses proches reste difficile pour une partie de la population, les professionnels de santé sont jugés comme des interlocuteurs prioritaires. Cela malgré la concurrence des moyens d'informations numériques, notamment l'IA chez les plus jeunes.


De manière générale, une large majorité des Français estiment facile d'aborder le sujet du VIH avec les professionnels de santé et leurs partenaires sexuels. En revanche, en parler avec ses parents, et dans une moindre mesure avec ses amis, semble un peu plus difficile.



Pour vous, est-ce facile ou difficile d'aborder le sujet du VIH avec chacune des personnes suivantes ?


Base : A tous, en %

La facilité à aborder le sujet du VIH auprès des différents interlocuteurs reste globalement au même niveau qu'en 2024. Elle apparaît légèrement plus élevée lorsqu'il s'agit de professionnels de santé que les Français ne consultent pas habituellement.



Pour vous, est-ce facile ou difficile d'aborder le sujet du VIH avec chacune des personnes suivantes ?
 Base : A tous, en % de réponses « Facile »

Pour se renseigner au sujet du VIH, le professionnel de santé s'impose comme le premier acteur vers lequel se tourneraient les Français, en particulier les plus âgés. Les moins de 35 ans citent davantage de sources d'informations, notamment numériques. L'IA est citée par près de la moitié des 15-24 ans, soit un niveau proche de celui d'Internet et des professionnels de santé.




Pour vous renseigner sur le sujet du VIH, vous auriez tendance à vous tourner en priorité vers... Plusieurs réponses possibles

Base : A tous, en %

Plus de $\frac{3}{4}$ des parents d'un enfant âgé de 10 à 25 ans affirment avoir abordé le sujet du VIH avec leur(s) enfant(s) (le plus souvent de manière spontanée). Un score en légère hausse depuis deux ans.



Affirment avoir abordé le sujet du VIH et de sa prévention avec leur(s) enfant(s) : 76



Avez-vous déjà abordé le sujet du VIH et de sa prévention avec votre/vos enfant(s) ? *Plusieurs réponses possibles*
Base : Aux parents d'enfants âgés de 10 à 25 ans, en %



Contacts Toluna – Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy

Directeur délégué – Stratégies politiques et d'opinion

jdlevy@toluna.com

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le **nom de l'institut**, le **nom du commanditaire** de l'étude, la **méthode d'enquête**, les **dates de réalisation** et la **taille de l'échantillon**.

Copyright © Toluna

All rights reserved. Nothing from this report is allowed to be multiplied, to be stored in an automated file, or to be made public electronically, mechanically, by photocopies, recording or any other manner, without written consent of Toluna.